

Maxforce Prime

Insekticídna nástraha vo forme pasty pre profesionálne použitie určená k ničeniu švábov a rusov.

Účinná látka: imidacloprid 21,5 g/kg

Pozor:

Prípravok obsahuje nebezpečnú látku imidacloprid (EC 428-040-8)

Xi

N



dráždivý nebezpečný pre životné prostredie

R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

R 51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

Prípravok môže ohroziť zdravie po požití, styku s pokožkou a sliznicami!

Prípravok je horľavý!

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Používajte iba podľa návodu!

Návod na použitie:

Prípravok je vhodný na použitie v potravinárskych prevádzkach, reštauráciách, bytoch, hoteloch, kanceláriách, skladoch, chovoch laboratórnych zvierat a ďalších miestach s výskytom švábov a rusov. Vhodný je hlavne do objektov, kde sa nemôže použiť klasický postrek. Nástraha sa aplikuje pomocou špeciálneho aplikátora na skrytých miestach, ako sú škáry a praskliny v múroch, rohoch miestností, za chladničkami a za kuchynskými linkami, v zásuvkách stolov a pod. Prípravok sa aplikuje tam, kde sú úkryty švábov a rusov, na miesta ktorá nesú intenzívne osvetlenie. Dávkovanie je prispôbené intenzite zamorenia a druhu hmyzu (v prepočte na 1 m² podlahovej plochy).

Aplikačná dávka – kvapka gelu s priemerom 5 mm, čo zodpovedá približne 0,1 g.

	Nízky výskyt	Vysoký výskyt
Rus domáci	0,1 g/m ²	2 x 0,1 g/m ²
Šváb obecný	2 x 0,1 g/m ²	3 x 0,1 g/m ²

(Nízky výskyt – hmyz neje vidno v priebehu dna Vysoký výskyt – hmyz je bežne vidno v priebehu dna)

Vyložení nástrahu je nutné po aplikácii kontrolovať a prípadne doplňovať podľa potreby (ak je spotrebovaná alebo na miesta, ktorá nebola ošetrovaná). Prvé účinky prípravku sú viditeľné do 24 hodín od aplikácie a prípravok zostáva účinný minimálne 3 mesiace po vyložení.

Nástrahu neaplikujte na miestach, ktorá sa bežne umývajú a na miestach, ktorá sú extrémne prašná alebo vlhká.

Prípravok neje možné aplikovať na miesta ošetrované postrekom alebo postrek aplikovať na nástrahu. Pachy z chemických látok nástrahu znehodnotia, stáva sa neatraktívna pre hmyz. Použitie prípravku nevyžaduje predbežnú prípravu, činnosť v ošetrovaných priestorov môže pokračovať bez prerušenia a obmedzenia.

Bezpečnostné opatrenia:

S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.

S37 Noste vhodné rukavice.

S35 Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

S57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

Pri práci používajte ochranný pracovný oblek (typ 3), nitrilové rukavice (min. hrúbka 0,40 mm) a ochranné okuliare (EN 166). Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Prípravok používajte tak, aby nedošlo ku kontaminácii potravín, vody, krmív a miest, kde sa s potravinami pracuje. Aplikujte na miesta, kde nástraha nebude dosiahnuteľná deťmi a domácimi zvieratami.

Ak je potrebné vykonať dekontamináciu ošetrovaného povrchu, môžeme gel odstrániť špongiou s použitím 5 % roztoku chloridu sodného. Prípravok na určitých materiáloch (napr. textilie, koberce a pod.) môže spôsobiť vznik škvrn – skúška podľa potreby.

Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.

Bezpečnostné opatrenia pri požiari: pri horení sa uvoľňuje oxid uhoľnatý. Pri hasení používajte dýchací prístroj.

Prvá pomoc:

Pri náhodnom požití: vypláchnite si ústa vodou. Vyhládajte ihneď lekársku pomoc. Zvracanie vyvolajte len v prípade, ak je postihnutý pri plnom vedomí, lekár nie je ihneď k dispozícii, došlo k požitiu väčšieho množstva (viac ako jedno prehltnutie) a neuplynula viac než 1 hodina od intoxikácie. Nesmie dôjsť k vdýchnutiu zvratkov. Pri zasiahnutí očí: ihneď vymývajte prúdom pitnej vody po dobu minimálne 15 minút (po 5 minútach odstráňte kontaktné šošovky pokiaľ sú používané). Ak podráždenie pretrváva, vyhládajte lekárske ošetrenie. Pri zasiahnutí položky: okamžite odstráňte zasiahnutý odev, dôkladne umyte zasiahnuté miesta mydlom a teplou vodou. V prípade, že podráždenie pokožky pretrváva, vyhládajte lekárske ošetrenie. Prípadné otravy možno konzultovať s Národným tox. informačným centrom v Bratislave, tel.č. 02/5477 4166.

Skladovanie:

Skladujte v originálnych uzavretých obaloch v suchých, chladných, uzavretých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov a chemických látok.

Nevystavujte teplotám nad 40 °C.

Chráňte pred mrazom a zdrojom vznietenia.

Skladovacia doba: 2 roky od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

Likvidácia obalov a prípadných zvyškov prípravku

Prázdne obaly (tuby) po znehodnotení spálte v schválenej spaľovni. Prípadné zbytky prípravku spálte v schválenej spaľovni nebezpečných odpadov za podmienok, ktoré platia aj pre obaly.

Hmotnosť: 4 x 30 g (PP tuby)

Číslo šarže a dátum výroby: uvedené na obale

Výrobca: Bayer S.A.S., Lyon, Francúzsko

Držiteľ registrácie: Bayer, s r.o., Siemsova 4, 155 00 Praha 5, ČR, tel. 00420 266101111

Registračné číslo CCHLP:

Maxforce® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer.