

SK - RATIMOR MÄKKÁ NÁVNADA

ODPORUČANÉ MNOŽSTVÁ POUŽITIA:

Vnútrore priestory (Mýš domová (*Mus musculus*), Potkan hnedý (*Rattus norvegicus*)):

Mýši: Veľké zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 metre od seba. Nízke zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 metrov od seba.

Potkany: Veľké zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 5 metrov od seba.

Nízke zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 metrov od seba.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok. Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezučastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov (v súlade s uplatniteľným kódexom osvedčených postupov, ak existuje). Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najzvyššie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie. Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtvu hlodavcu v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov. Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov. Nepoužívajte výrobok v pulznych procesoch ukladania návnad. Keď umiestňujete deratizačné stanice blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

Vonku okolo budov (Mýš domová (*Mus musculus*), Potkan hnedý (*Rattus norvegicus*)):

Mýši: Veľké zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 metre od seba. Nízke zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 metrov od seba.

Potkany: Veľké zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 5 metrov od seba.

Nízke zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 metrov od seba.

Chrňte návnadu pred poveternosnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotami. Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok. Pri použití vonku návnada musí byť umiestnená v zakrytých a chránených miestach s návnadou, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat. Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezučastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov. Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najvyššie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie. Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtvu hlodavcu v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov. Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov. Nepoužívajte výrobok v pulznych procesoch ukladania návnad. Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch. Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné nádrže, zavlazovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

Vonkajšie otvorené oblasti a sklady odpadu (Potkan hnedý (*Rattus norvegicus*)):

Veľké zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 5 metrov od seba. Nízke zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 metrov od seba.

Chrňte návnadu pred poveternosnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotami. Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok. Pri použití vonku návnada musí byť umiestnená v zakrytých a chránených miestach s návnadou, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat. Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezučastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov. Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najvyššie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie. Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtvu hlodavcu v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov. Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov. Nepoužívajte výrobok v pulznych procesoch ukladania návnad. Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch. Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné nádrže, zavlazovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

Opis spôsobu aplikácie: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staniciach odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou.

UNICHEM

Výrobca a držiteľ registrácie:

UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovensko, Tel.: +386 1 7558 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si

Dovozca:

UNICHEM Slovakia s.r.o., Rybníčná č.40, 831 06 Bratislava, Tel.: +421 911 221 311

RATIMOR®

BROMADIOLON

0,05 g/kg

Mäkká návnada 10 g

SO
SPECIÁLNOU
VŔŇOU



5 kg

Kanalizácie (Potkan hnedý (*Rattus norvegicus*)):

Pri zamorení potkanmi v kanalizácii použij 200 - 200g návnady na šachtu. Pri vysokom zamorení použij 200 g na šachtu.

Opis spôsobu aplikácie: Návnada na okamžité použitie, ktorá sa má upevniť alebo použiť v deratizačných staniciach, aby sa na zabránenie kontaktu návnady s odpadovou vodou. Zakryté a chránené miesta s návnadou. Návnady sa musia umiestňovať tak, aby neprišli do kontaktu s vodou a neboli odplavane. Nepoužívajte výrobok v pulznych procesoch ukladania návnad.

Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie.

PRVÁ POMOC: Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastat s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce ďasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči. Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom. V prípade domácej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou s mydlom; zasiahnutú oči vypláchnite očnou tekutinou na vlnkách očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút; orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osoby v bezvedmi. Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnú domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom. **Deratizačné stanice musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“, „obsahuje rodenticid“, „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „prípade neohody zavolať do toxikologického centra (Telefón: 00421 2 54 77 41 66)“.** Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá. Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia antikoagulantného rodenticidu účinné 4 až 10 dní po použití návnady. Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, prič ich likvidáciu používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte. Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

NÁVOD NA BEZPEČNÉ ZNEŠKODNENIE VÝROBKU A JEHO OBALU: Na konci deratizácie zlikvidujte neskončenou návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Tento materiál a jeho obal sa musí zlikvidovať bezpečne. Balenie, zvyšky nepoužitej návnady a mŕtvu hlodavcu zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Ak je potrebné, poraďte sa s profesionálnym odpadovým operátorom alebo miestnym úradom. Odporúča sa používanie rukavíc.

SKLADOVANIE: Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat. Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo nádrží a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu.

Len pre vyskúšaných profesionálnych používateľov.

Môže poškodiť nenarodené dieťa. Spôsobuje poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste ochranné rukavice. Po expozícii alebo podozrení z nej: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi nariadeniami, okrem prázdnych čistých obalov, ktoré sa môžu likvidovať ako odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Účinná látka: Bromadiolon 0.005 % (CAS: 28772-56-7)

Číslo autorizácie: SK 13-MRS-005

Obsah: 5 kg

Dátum výroby, dátum spotreby a číslo šarže: na obale.

NEBEZPEČENSTVO



UFI: 1M00-50AF-600J-GM1S



31015