

## Rodilon<sup>®</sup> pasta

Požerová nástraha vo forme tuhej pasty pre profesionálne použitie na ničenie škodlivých hlodavcov (myš domová, potkan čierny a hnedý) v uzavretých objektoch. Prípravok sa používa bez ďalších úprav.

**Účinná látka:** difethialone (CAS 104653-34-1) 0,025 g/kg

### **H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.**

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270 Pri používaní výrobku nejezte, nepite ani nefajčite.

P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

**Výrobca/ Držiteľ registrácie:** Liphatech S.A.S., Bonnel BP3, 47480 Poht du Casse, Francúzsko

**Registračné číslo:** 2009/4329/3926/SK/MA/4862

### **Vlastnosti:**

Nástraha zostáva účinná i vo vlhkom, teplom alebo prašnom prostredí. Obsahuje horkú látku zabráňujúcu náhodnému požitiu človekom. Použitie v rôznych podmienkach – komunálna hygiena, živočíšna výroba, potravinársky priemysel, apod. Potkany obvykle hynú po 4 – 7 dňoch po prijímaní, myši po 8 – 10 dňoch. Už jednorazový príjem nástrahy postačuje k dosiahnutiu smrteľnej dávky, ale má aj kumulatívny účinok. Celková eliminácia populácie trvá 2 až 4 týždne a je ovplyvnená v závislosti na stupni zamorenia, preto môže trvať i dlhšie.

### **Návod na použitie:**

Pred vlastným deratizačným zásahom vykonajte prieskum a zistíte intenzitu a miesta výskytu. Podľa výsledkov prieskumu voľte dávku a rozmiestnenie nástrah. Pokiaľ to podmienky dovoľujú, odstráňte akúkoľvek alternatívnu potravu a zamedzte prenikaniu hlodavcov z okolia do budov. Nástrahu pokladajte do deratizačných staničiek (miesta musia byť označené). Dbajte vždy na to, aby nástraha bola mimo dosahu detí a necieľových zvierat. Pri vykonávaní deratizácie vo verejných priestoroch musí byť ošetrený priestor označený a musia tam byť k dispozícii údaje o nebezpečenstve otravy antikoagulantmi a opatreniach v prípade otravy. Pri aplikácii ukladajte celé vrecúška, neotvárajte ich. Jedno vrecúško obsahuje 10 g nástrahy.

### **Dávkovanie:**

**Potkany:** vysoký výskyt – 6 vrecúšok po 4 - 5 m, nízky výskyt - 6 vrecúšok po 8 – 10 m.

**Myši:** vysoký výskyt – 2 vrecúška po 1 – 1,5 m, nízky výskyt – 2 vrecúška po 2 – 3 m.

Vždy vykonajte následnú kontrolu a doplníte nástrahu podľa potreby. Frekvenciu kontrol a ich počet prispôbte množstvu hlodavcov. Odstraňujte uhynuté hlodavce v krátkych intervaloch v priebehu hubenia, minimálne tak často, ako sú kontrolované a

doplňované nástrahy. Prípravok nepoužívajte ako trvalú nástrahu. Nespotrebované zvyšky je potrebné po skončení zásahu odstrániť priestoru a opakovane ich použiť, prípadne ich zneškodniť.

**Bezpečnostné opatrenia:**

Pri práci s prípravkom používajte bežný pracovný odev, jednorazové latexové rukavice vhodné ako ochrana pred biologickým znečistením (EN 455-3) alebo ekvivalent, pracovnú obuv. Pri práci a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a rukavíc a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené jesť, piť a fajčiť. Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.

**Príznaky otravy:** Krvácanie z nosa a ďasien, vykašliavanie krvi, početné alebo veľké podliatiny, neobvyklé vnútorné bolesti, krv v moči. Príznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých dňoch.

**Prvá pomoc:**

Po požití: Ústa vymyte dostatkom vody. Pri prehltnutí vyhľadajte okamžite lekársku pomoc, pričom ukážte obal/štítok/kartu bezpečnostných údajov. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ vám to neprikáže lekár. Nepodávajte ústami nič osobe, ktorá je v bezvedomí.

Po zasiahnutí očí: Nechajte si oči otvorené a preplachujte ich pomaly a mierne vodou po dobu 15 - 20 minút. Ak máte kontaktné šošovky, vyberte si ich po prvých 5 minútach, a potom pokračujte s preplachom očí. Ak problémy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: Vyzlečte si kontaminované šatstvo. Pred opätovným oblečením ho operte. Okamžite si umyte pokožku vodou a mydlom. Ak problémy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Antidotom v prípade otravy je vitamín K1, dávku ktorého určí lekár.

V prípade otravy môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel: 00421 2 54774166.

**Skladovanie:**

Prípravok skladujte v originálnych obaloch, v uzavretých, suchých a vetraných skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladujte s chemickými aromatickými látkami, ktoré by mohli ovplyvniť atraktivitu nástrahy.

**Skladovacia doba: 3 roky od dátumu výroby.**

**Likvidácia obalov, prípadne zvyškov prípravku:**

Prázdne obaly po znehodnotení spálte v schválenej spaľovni (nesmie byť opätovne použité). Prípadné zvyšky prípravku spálte v spaľovni rovnakých parametrov ako obaly.