

MAXIMON PASTA Nástraha (na priame použitie) Bromadiolón 0,005% m/m

Regist. c.: 2012/838/1170/SK/ AMR/8896

Kategória(e) používateľov: Vyškolený profesionál

Cieľové : Potkan hnedý / Rattus norvegicus, Rattus rattus / Myš domová (Mus musculus).

Oblasti použitia : Protikan hnedý, Potkan tmavý, Myš domová na Vnútorné priestory, na vonku okolo budov a na vonkajšie otvorené oblasti a skladky odpadu.

Spôsob(y) aplikácie : aplíkacia nástrahy : Nástraha na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácií - Zakryté a chránené miesta s nástrahou - Priama aplikácia nástrahy na okamžité použitie do brihoch

Aplíkca(ná)é dávka(v) a aplíkca(ná)é frekvencie :

Myš domová: Veľké zamorenie: 20-30g nástrahy každé 2 metrov, Nizke zamorenie: 20-30g nástrahy každé 5 metrov Potkan: Veľké zamorenie: 60-100g nástrahy každé 5 metrov, Nize zamorenie: 60-100g nástrahy každé 10 metrov, v nore: 60 až 100 g nástrahy na brihoch.

Trvalé umiestnenie nástrahy :

Myš domová: Veľké zamorenie: 20-30g nástrahy každých 5 metrov Potkan: Veľké zamorenie: 60-100g nástrahy každých 5 metrov, Nizke zamorenie: 60-100g nástrah každých 10 metrov

Opatrenia na zniženie rizika :

Ked je možné, informujte pred deratizáciou prípadne nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hladovcov [v súlade s uplatnitelným kódexom osvedčených postupov, ak existuje]. Zvážte preventívne kontroly opatrenia (upchiate dieru, čo najrozšiaľejšie) odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zniženie pravdepodobnosti opátovnej invázie. Na zniženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v časťach intervalov hľadajte a odstraňte mŕtve hladovce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov. Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania nástrah.

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brihoch.

Trvalé umiestnenie nástrahy: Trvalé umiestnenie nástrah je striktne obmedzené na miesta s vysokým potenciájom opátovnej invázie, keď sa ostatné metódy kontrol preukázali ako nedostatočné. Stratégia trvalého umiestnenia nástrah sa pravidelne reviduje v rámci integroanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opátovné zamorenie.

V brihoch: Ked je možné, informujte pred deratizáciou prípadne nezúčastnené osoby o deratizácii hladovcov [v súlade s uplatnitelným kódexom osvedčených postupov, ak existuje].

Ked je možné, informujte pred deratizáciou prípadne nezúčastnené osoby o deratizácii hladovcov [v súlade s uplatnitelným kódexom osvedčených postupov, ak existuje]. Len pre vyškolených profesionálnych používateľov. Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenčiu na účinnú látku. Nestrídejte používanie rôznych antikoagulantov so povarenou alebo slabosťou potenciou na zvýšenie sladkotiny rezistenčie. Na striedavé používanie vzárovej používanie neantikoagulantného rodenicídzu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu. Medzi aplikáciami neumývajte vodu stanice na nástrahu ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrytých a chránených miestach s nástrahou. Mŕtve hladovce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

Pokyny na používanie :

Chráňte nástrahu pred poveternostními podmienkami. Umiestnite nástrahu v oblastiach, kde nehrdzí zaplavenie. Vymrieňte nástrahu na miestach s nástrahou, kde bola nástraha poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou. Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok. Dodržujte prípadne ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Trvalé umiestnenie nástrahy: Ked je možné, odporúča sa, aby sa ošetrovaná oblasť skontrolovala najmenej každé 4 týždne, aby sa predložilo selekciu rezistenternej populácie. Dodržujte prípadne ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

V brihoch: Nástraha musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia nečierových druhov zvierat a deťí. Zákrytky alebo zablokujte vstupy do brihoch s nástrahou, aby ste znížili riziko odmetnutia a vysypania nástrahy. Dodržujte prípadne ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja. Pred umiestnením nástrahy vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hladovcov, ich miest aktivity a určte pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia. Odstráňte toho nečistotu, ktoré sú pre hladovce ľahko dosiahnutelné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistotu zamorenej oblasti tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyrúpi populáciu hladovcov a s tým dosiahnutie prijatia nástrahy. Výrobok by sa mal používať len ak súčasť systému integroanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahrňa hygienické opatrenia a, k ak je možné, fyzické metódy kontroly. Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predaj objavili známky aktivity hladovcov (napr. cestičky, hnedzidiská, miesta krmenia, plechy, brihy atď.). Ked je možné, musia byť deratizačné staničky pripojené k zemi alebo k inym konštrukciám. Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenicídza a že sa s nimi nesmie hybať a nesmú sa otvoriť.

MAXIMON PASTA Bromadiolón, CAS 28772-56-7 0,005% m/m

Výstražné upozornenia

Spôsobuje poškodenie orgánov (krvný) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii .

Môže poškodiť nenarodené dieťa.

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Nepoužívajte, kým si neprečitate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

Nevdychujte prach. Po manipulácii starostivo umyte rukami.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčíte.

Noste ochranné rukavice. Po expozícii alebo podzoraní z nej:

Vyhľadajte lekársku pomoc. Ak pocípite zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc.Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými

predpismi.



LODI S.A.S. Parc d'activités des quatre routes 35390 Grand Fougeray, Tel. 02-99-08-48-59

[Ak to vyžadujú národné pravidlá alebo legislatív] Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri nástrahách musí byť oznámen s vysvetlením rizíka primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy. Návoda by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odlihnúť preč od deratizačnej staničky. Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domáčich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat. Umiestnite výrobok mimo potraviny, nápojov a kŕmidla pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku. Počas manipulácií s výrobkom poste ochranné rukavice odolné voči chemickým látкам (EN374). Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčíte. Používajte výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku. Frekvencia prezeraania deratizáciu oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uväznenie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie. Táto frekvencia by mala byť v súlade s odporúčaniami príslušného kódexu osvedčených postupov. Ak je príjem nástrahy pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenosť miest a možnosť zmeny formuľácie nástrahy. Ak sú nástrahy po období deratizácie 35 dní nadľaik konzumované a nie je možné zošorovať pokles činnosti hladovcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hladovce sú rezistentné, takže zvážte používanie rodenicídzu bez antikoagulantu, ak je dostupný, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenicídzu. Zvážte tiež používanie pasci ako alternatívneho opatrenia na kontrollu hladovcov. Nevyrátejte vrecká, ktoré obsahujú nástrahu.

Údaje o pravdepodobných alebo nepravdepodobných nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prej pomoci a náučného opatrenia na ochranu životného prostredia :

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehlrite môžu vzniknúť symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahrňajú krvácanie z nosa a krvácajúce dásny. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči. Protilíkta: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom. V prípade: Dermalnej expozícii umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydom. Zásahnutia očí vypláchnite na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút. Orálnej expozícii dokladne vypláchnite ústa vodou. Nikdy nepodávajte nič cez ústa osobu v bezvedomí.

Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehlrite okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehľite domáce zvierat, spojte sa s veterinárnym lekárom. Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciemi: „nehýbte ani neotvárajte“, „obsahuje rodenicídzu“, „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade incidentu zavolajte do toxikologického centra +421 2 54 774 166“. Nebezpečné pre volne žijúce zvieratá.

Návod na bezpečné znieskodenie výrobku a jeho obalu : Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú nástrahu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami.

Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok : Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobi držte zatvorené a mimo priameho slnčného žiarenia.

Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom deťí, vtákov, domáčich zvierat a hospodárskych zvierat. Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenicídzy účinné 4 až 10 dní po prehlrite nástrahy. Hladovce môžu prenášať chorobu. Nedopýkajte sa mŕtvych hladovcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte. Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

10KG

Lot : PA0200318

Date exp :

Version 10/07/2022