



HARMONIX™

Rodent Paste

RODENTICÍD

RB - Nástraha (na priame použitie)

Účinná látka: Cholecalciferol 0.075 g/100 g CAS 67-97-0

IBA PRE PROFESIONÁLOV

DÁTUM VÝROBY – na obale
DOBA POUŽITEL'NOSTI – 36 mesiacov od dátumu výroby
SÉRIOVÉ ČÍSLO – na obale

Číslo autorizácie: SK20-019

UFI: TD41-Q04K-T00W-CJ4Y

Držiteľ autorizácie:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, Francúzsko
+33 (0) 4 51 08 43 21

Výrobca:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, Francúzsko
+33 (0) 4 51 08 43 21

BIOCÍD BY SA MAL POUŽÍVAŤ SO ŠPECIÁLNYMI BEZPEČNOSTNÝMI OPATRENAMI. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE ŠTÍTOK A KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV MATERIÁLU.

CIEĽOVÉ ORGANIZMY

Potkan hnedý (*Rattus norvegicus*) – dospelé a mladé jedince

Potkan tmavý (*Rattus rattus*) - dospelé a mladé jedince

Myš domová (*Mus musculus*) – dospelé a mladé jedince

SPÔSOB APLIKÁCIE A OBLASŤ POUŽITIA

	V deratizačných staničkách odolných voči manipulácii	Zakryté a chránené miesta s návradou*	Priama aplikácia nástrahy do nory
Vnútorne	Profesionáli Vyškolený profesionál	—	—
Vonkajšie okolo budov	Profesionáli Vyškolený profesionál	Vyškolený profesionál	Vyškolený profesionál
Vonkajšie: otvorené priestory a skládky odpadu	Vyškolený profesionál	Vyškolený profesionál	Vyškolený profesionál

* v prípade ak poskytujú rovnaký stupeň ochrany necieľových druhov a ľudí ako deratizačné staničky.

DÁVKOVANIE A FREKVENCIA

CIELOVÉ ORGANIZMY	NÍZKA ZAMORENIA	VYSOKÉ ZAMORENIA	KOMENTÁRE
Potkan hnedý, Potkan tmavý	<ul style="list-style-type: none"> •100-200 g nástrahy na jedno miesto; •Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10-20 m 	<ul style="list-style-type: none"> •100-200 g nástrahy na jedno miesto; •Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 3-10 m 	Ak sa nástraha úplne spotrebuje v rámci jedného kontrolného intervalu, je potrebné pridať ďalších 200 g výrobku.
Myš domová	<ul style="list-style-type: none"> •20 g nástrahy na jedno miesto; •Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5-20 m 	<ul style="list-style-type: none"> •20 g nástrahy na jedno miesto; •Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 2-5 m 	Ak sa nástraha úplne spotrebuje v rámci jedného kontrolného intervalu, je potrebné pridať ďalších 20 g výrobku.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

- Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.
- Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.
- Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.
- Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.
- Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.
- Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť.
- Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

- Ak je príjem nástrahy pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie nástrahy.
- Ak sú nástrahy po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu s antikoagulantom, ak je dostupný, alebo použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.
- Nástraha vo vreckách: Neotvárajte vrecká obsahujúce nástrahu.

A. Pokyny na používanie - profesionáli

Nástraha na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

Vnútorne, vonkajšie: okolo budov

- Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 1 až 2 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola nástraha prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte nástrahu.
- Pred umiestnením nástrahy vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.
- Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad) Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia nástrahy.
- Nástraha by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtiahnuť preč od deratizačnej staničky.
- Na konci procesu odstráňte zvyšnú nástrahu alebo deratizačné staničky.

Exteriér: okolo budov

- Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.
- Vymeňte nástrahu v deratizačnej staničke, v ktorej je nástraha poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.
- Na konci procesu odstráňte zvyšnú nástrahu alebo deratizačné staničky.

B. Pokyny na používanie - vyškolený profesionál

Nástraha na okamžité použitie: vnútorne, vonkajšie: okolo budov, vonkajšie: otvorené priestory a skládky odpadu.

- Pred umiestnením nástrahy vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.
- Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelech, brlohy atď.).

- Nástraha by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtiahnuť preč od deratizačnej staničky.

Vonkajšie: okolo budov, Vonkajšie: otvorené priestory a skládky odpadu

- Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.
- Vymeňte nástrahu v deratizačnej staničke, v ktorej je nástraha poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Dodatočné opatrenia, ktoré sa majú zväžiť pri priamom použití v norách (Vonkajšie: okolo budov, Vonkajšie: otvorené priestory a skládky odpadu)

- Nástrahy musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat a detí.
- Zakryte alebo zablokujte vstupy do nôr s nástrahou, aby ste znížili riziko odmietnutia a vysypania nástrahy.

OPATRENIA NA ZMIERNENIE RIZIKA

- Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

A. Opatrenia na zmiernenie rizika - profesionáli

Vnútorne, vonkajšie: okolo budov

- Nepoužívajte výrobok ako trvalé nástrahy na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.
- Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.
- Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.
- Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania nástrah.

Vonkajšie: okolo budov

- Nepoužívajte tento výrobok priamo v norách.
- Výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
- Používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku.
- Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.
- Odstráňte uhynuté hlodavce v súlade s platnou legislatívou. Vyvarujte sa priameho kontaktu.

B. Opatrenia na zmiernenie rizika - vyškolený profesionál

Vnútorne, vonkajšie: okolo budov, vonkajšie: otvorené priestory a skládky odpadu

- Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania nástrah.

- V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).
- Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.
- Medzi aplikáciami neumývajte vodou stanice na návnadu ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrytých a chránených miestach s nástrahou.

Vonkajšie: otvorené priestory a skládky odpadu

- Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky, aby sa zabránilo sekundárnej otrave.
- Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať aspoň raz za 1 - 2 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne. To isté platí pokiaľ aplikácia trvá dlhšie ako 35 dní.

PRVÁ POMOC

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom.
- zasiahnutia očí vždy skontrolujte a vyberte kontaktné šošovky, vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút.
- orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí. Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. V prípade potreby kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel. č.: 02/547 741 66. Ak výrobok prehltnie domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom.
- Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu nástrahy s vodou.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

NÁVOD NA BEZPEČNÉ ZNEŠKODNENIE VÝROBKU A JEHO OBALU

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú nástrahu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami.

VIAC INFORMÁCIÍ

- Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.
- Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.
- Obsah cholekalciferolu (vitamín D3, účinná látka) v BP (w/w %) 0,077 (technický), 0,075 (čistý) minimálna čistota účinnej látky podľa nariadenia (EÚ) 2019/637: 970 g/kg [(Ph. eur.* 7,0; 01/2008:0575 korigovaný 6,5): min. 970 g/kg (zahŕňa aj akýkoľvek prítomný precholecalciferol)].